










Como a compreensão do cérebro nos torna melhores terapeutas EMDR?: Atualização teórica





URI BERGMANN, Ph.D. - ubergmann@att.net

*Como a compreensão do cérebro nos torna melhores terapeutas EMDR?:
Atualização teórica*



*Como a compreensão do cérebro nos torna melhores terapeutas
EMDR?: Atualização teórica*




URI BERGMANN, Ph.D. - ubergmann@att.net

Tratamento com EMDR e TEPT Tipo I

¥ Iniciou-se em 1989 como EMD

- O alvo era a memória explícita do incidente
- Fases 3, 4, 5 e 6
- Eram realizadas de 1 a 3 sessões de 90 minutos
- Se o evento fosse recente
- O tratamento era ampliado para cinco ou seis sessões de 90 minutos
- Devido ao protocolo para eventos recentes

FIGURE 1. Brain Activation Sites^a in Traumatized Subjects With and Without PTSD



^a Areas of significantly ($p < 0.001$) increased activation during the final 30 seconds of a 60-second period of recalling a traumatic event, relative to average baseline activation 60 seconds before each recollection of the traumatic event, superimposed on T₁-weighted magnetic resonance imaging templates.





Figure 1: Regions of activation during memory recall versus implicit baseline where the comparison group (n=10) shows greater activation than the PTSD group (n=10), $k > 10$.

Figure
1

Regions where patients with PTSD (without major dissociation) exhibited less activation during traumatic memory recall than trauma-exposed controls without PTSD¹¹



PTSD, posttraumatic stress disorder.

Tratamento com EMDR e apresentações caracterológicas

¥ Em 1991, EMD tornou-se EMDR

- Passamos do foco exclusivo no TEPT Tipo I
- TEPT complexo
- Transtornos do apego
- Neuroses

Tratamento com EMDR e apresentações caracterológicas

¥ O alvo do tratamento permaneceu

- Memória explícita/declarativa/consciente
- Duração do tratamento
- De curto prazo
- Para longo prazo

Tratamento com EMDR e apresentações caracterológicas

≠ Mudança

- Da centralidade do sistema nervoso central
- Para a centralidade do sistema nervoso autônomo
- Os sintomas caracterológicos são impulsionados por estados autonômicos desregulados
- Estados corporais desregulados, implícitos e não conscientes
- Estados aos quais a cognição consciente, por si só, não consegue acessar nem modificar

EIXOS TEMÁTICOS

¥Anatomia básica

- O cérebro dividido
- Sistemas afetivos polivagais
- Regulação afetiva
- Redes neurais implícitas
- Diversos sistemas de memória
- Implicações para o tratamento com EMDR

O erro de Descartes

¥ René Descartes (1644)



- Dubito, ergo cogito (Duvido, logo penso).
- Cogito, ergo sum (Penso, logo existo)
- Em uma única formulação, Descartes consolidou a percepção comum de uma divisão fundamental entre corpo e mente.
- Em um mundo obcecado pelo pensamento

O erro de Descartes (1644)



Terapias comportamentais, cognitivas e psicanalíticas apoiavam-se no hemisfério esquerdo

- Linear, abstrato, rígido, fechado e dissociado do corpo
- Processamento de informações
- Para reparar dificuldades emocionais e relacionais
- Geradas e mediadas pelo hemisfério direito, não linear, hiperassociativo, aberto e somatossensorial

Mudança de paradigma

¥ Mudança de paradigma

- Da neurociência cognitiva (hemisfério esquerdo)
- Para a neurociência do desenvolvimento e afetiva (hemisfério direito)
- Uma aproximação entre pesquisadores e clínicos

Mudança de paradigma

¥ Emoções de base corporal

- Estados psicobiológicos
- Estão dominando a pesquisa
- Sinalizando que a prática clínica faça o mesmo

Mudança de paradigma

≠ Mudança de...

- Interpretação e insight
- Para processos relacionais e afetivos

O cérebro dividido

¥ O hemisfério direito possui proporções significativamente maiores de substância branca do que o esquerdo

- A presença de mais substância branca no hemisfério direito
- Indica maior transferência de informações entre regiões cerebrais
- Refletindo sua atenção ao panorama global

O cérebro dividido

- ¥ Devido à maior quantidade de substância branca no hemisfério direito
 - E, portanto, ao maior grau de mielinização
 - Há facilitação da rápida transferência de informações
 - Entre o córtex e as regiões abaixo do córtex
 - Sistema límbico, mesencéfalo e tronco encefálico
 - Maior integração de uma variedade mais ampla de tipos de informação
 - Em comparação com o hemisfério esquerdo, organizado de forma mais focal

O cérebro dividido

¥ Devido à conectividade cerebral,

- O hemisfério esquerdo
- Prioriza a comunicação local
- E a transferência de informações
- Dentro de suas próprias regiões

O cérebro dividido

¥ Hemisfério esquerdo

- Fechado
- Útil para informações estáticas, fixas e isoladas
- Ex.: ciência, matemática
- Portanto, atenção estreita e fortemente focalizada

McGilchrist, I. (2009). *The Master and his Emissary*. Yale University Press

McGilchrist, I. (2021). *The Matter With Things: Our Brains, Our Delusions, and the Unmaking of the World*. London: Perspectiva Press

O cérebro dividido e o insight

- ¥ O insight explícito é mediado pelo hemisfério esquerdo
 - Útil para informações estáticas, fixas e isoladas
 - Ex.: ciência e matemática
 - Portanto, atenção estreita e fortemente focalizada
- O insight implícito é mediado pelo hemisfério direito.

McGilchrist, I. (2009). *The Master and his Emissary*. Yale University Press

McGilchrist, I. (2021). *The Matter With Things: Our Brains, Our Delusions, and the Unmaking of the World*. London: Perspectiva Press

O cérebro dividido

¥ Consciente vs. inconsciente

- O hemisfério esquerdo medeia elementos conscientes da emoção e da memória
- A amígdala esquerda medeia a emoção consciente
- A amígdala direita medeia informações emocionais inconscientes

O cérebro dividido

¥ Hemisfério direito

- Aberto
- Útil para explorar o que ainda não conhecemos
- Nossa vida interior e nossos relacionamentos
- Portanto, atenção sustentada, ampla e aberta
- Aprende melhor em um contexto relacional (não dissociado)

O cérebro dividido

¥ "Se é o hemisfério direito que permanece vigilante para tudo aquilo que existe lá fora, somente ele pode nos trazer algo diferente do que já conhecemos. O hemisfério esquerdo lida com aquilo que conhece e, portanto, prioriza o esperado — seu processo é preditivo. Ele prefere positivamente aquilo que conhece. Isso o torna mais eficiente em situações rotineiras... Porém, menos eficiente do que o direito quando nossas suposições iniciais precisam ser revistas ou quando é necessário distinguir informações antigas de material novo."

Mudança de paradigma

¥ Allan Schore (2012)

- **“...As comunicações emocionais entre terapeuta e paciente estão no núcleo psicobiológico da aliança terapêutica... processos emocionais de cérebro direito para cérebro direito são essenciais ao desenvolvimento e à psicopatologia... e, portanto, também à psicoterapia.”**

EMOÇÕES vs. SENTIMENTOS


¥ Emoções

- Programas complexos, em grande parte automatizados
- Mapas neurais fixos e pré-configurados
- Mediados por sistemas biológicos operacionais de emoção
- Construídos e conservados ao longo da evolução
- Orientados para a ação
- Compostos por ações em nosso corpo
- Expressões faciais
- Posturas
- Alterações nas vísceras e no ambiente físico interno

EMOÇÕES vs. SENTIMENTOS

≠ Sentimentos

- Percepções compostas, reflexivamente conscientes
- Traduções cognitivas
- Do que está acontecendo em nosso corpo
- Enquanto estamos no processo de experienciar uma emoção
- Percepções do nosso estado mental durante esse mesmo período



Redes neurais

¥ Rede Executiva Central

- Rede de Modo Padrão
- Rede de Saliência

Rede Executiva Central

¥ Áreas interconectadas do...

- **Córtex pré-frontal dorsolateral**
- **Córtex parietal posterior**
- **Mediando informações**
- **Conscientes**
- **Cognitivas**
- **Computacionais**

Rede de Modo Padrão

- ¥ Um sistema interconectado, anatomicamente definido e predominantemente do hemisfério direito
 - Composto por áreas do
 - Lobo temporal medial
 - Córtex pré-frontal medial
 - Córtex cingulado posterior
 - Áreas hipocampais
 - Córtices parietais medial, lateral e inferior

Rede de Modo Padrão

✚ **Medeia**

Memória afetiva procedural autorreferencial

Imagens mentais internas

Representações/esquemas do self

Representações de objeto

Regulação afetiva

Integração entre afeto e cognição

Representações somatossensoriais

Experiência de um senso de self corporificado

Rede de Saliência

¥ Composta por

Ínsula anterior — hub

Giro cingulado anterior dorsal

Determina a saliência emocional das informações

Determina a ativação de uma das seguintes redes:

Rede Executiva Central, ou

Rede de Modo Padrão

PAG e COLÍCULOS

¥Colículos superiores e colículos inferiores

Coletivamente denominados tectum


Os colículos inferiores medeiam informações auditivas e somatossensoriais

Os colículos superiores, em conjunto com a substância cinzenta periaquedutal (PAG)

Medeiam a integração de informações sensoriais e afeto

Produzindo emoção bruta/básica

Produzindo consciência primária



Sistema Nervoso Autônomo

¥ Quatro ramos do SNA

- **Atuam para manter o equilíbrio homeostático**
- **Sistema nervoso simpático**
- **Parassimpático**
- **Sistema nervoso entérico (cérebro intestinal)**
- **Sistema nervoso cardíaco intrínseco (cérebro cardíaco)**

Sistema Nervoso Autônomo

¥ Sistema Nervoso Simpático

- Expansão de energia — mediação da ativação
- Medeia comportamentos de aproximação, luta ou fuga

Sistema Nervoso Autônomo

¥ Sistema Nervoso Parassimpático

- **Conservação de energia/homeostase**
- **Mediação da calma**
- **Medeia comportamentos de evitação, congelamento ou imobilização**

Sistema Nervoso Autônomo

¥ Sistema Nervoso Entérico

- **Controle autônomo do sistema gastrointestinal**
- **Fortemente relacionado à interocepção e à emoção**
- **Medeia a sinalização bidirecional pelo nervo vago**
- **Medeia o afeto traumático**

Interocepção

❖ O processo pelo qual o sistema nervoso

- Detecta
- Interpreta
- Representa
- Sinais corporais internos
- Conscientes
- Representacionais
- Permite que você perceba
- Seus batimentos cardíacos
- Aperto no peito

Neurocepção

- ❖ **Por meio do processamento de informações sensoriais do ambiente e de nossas vísceras**
 - **Nosso sistema nervoso avalia continuamente o risco**
 - **Implicitamente**
 - **Inconscientemente**
 - **A fiação neural da evolução para a selva**
 - **Límbica, em seu nível mais elevado**
 - **Mas mediada principalmente ao nível do mesencéfalo e do tronco encefálico**
 - **Daí: neurocepção (não consciente) versus percepção (consciente)**

Sistema Nervoso Autônomo

¥ Sistema nervoso cardíaco intrínseco

- **Medeia a variabilidade da frequência cardíaca (VFC)**
- **Marcador-chave de flexibilidade emocional e resiliência**
- **Regulação emocional**
- **Arritmia Sinusal Respiratória (ASR)**
- **Uso da respiração para aumentar a VFC**

Sistema Nervoso Autônomo

- VFC alta
 - – Maior flexibilidade/adaptabilidade
 - – Forte influência parassimpática (vagal)
 - – Associada à resiliência, regulação emocional e saúde
- VFC baixa
 - – Adaptabilidade reduzida
 - – Predomínio simpático ou redução do tônus vagal
 - – Associada a estresse, trauma, doença e piores desfechos

Sistema Nervoso Autônomo

¥ Em resumo

- SNS — mobiliza
- SNP — restaura
- SNE — detecta e regula o estado interno (intestino)
- SNCl — ajusta dinamicamente o débito cardíaco e o ritmo emocional

- **Sistema parassimpático**
inflexível que promove congelamento por imobilização
- ❖ **Ascending Reticular Activation System**
 - A sympathetic system providing neural excitation and promotion of rapid mobilization for behaviors associated with fight and flight.
- **Sistema parassimpático**
flexível, de efeito inibitório (um freio)
- ❖ **Dorsal Vagal Complex**
 - An inflexible parasympathetic system promoting an immobilized freeze in functioning in response to danger.
- ❖ **Ventral Vagal Complex**
 - A flexible parasympathetic system of inhibitory effect (a brake), promoting increased calm.

- Palmaris profundus — o palmar
- Músculos do ouvido médio — extração da voz humana do ruído de fundo
 - Vestibulocochlear complex
 - At birth, regulates
 - Striated muscles of the head and face - social gesture
- Laringe — vocalização
 - Facial muscles - emotional expression
- Faringe — prosódia
 - Eyelids - gaze
 - Middle-ear muscles - extracting the human voice from the background
- Músculos da mastigação
 - Larynx - vocalization
 - Pharynx - prosody
 - Muscles of mastication

- Por volta dos 3 anos, torna-se suficientemente mielinizado

- Utiliza o coração para
 - ❖ Ventral Vagal Complex
 começar a regular e equilibrar o afeto de forma suave e refinada, na ausência do cuidador.
 - Mediates attachment, but not self-regulation
 - The caregiver is still required to function as a ventral vagal regulator.
 - By 3 years of age, becomes sufficiently myelinated
- O coração funciona como um turbo finalmente ajustado, bidirecionalmente...
 - Utilizes the heart to begin to gently/finely regulate and balance affect, in the absence of the caregiver.
 - Heart functions like a finely-tuned turbo, bidirectionally...



MEMORY SYSTEMS

¥ SISTEMAS DE MEMÓRIA

REPRESENTACIONAL PERCEPTIVA

- Também chamada NÃO DECLARATIVA
- Implícita

- Inconsciente

¥ EPISODIC


- Somatossensorial

- Explicit
- Procedural
- Não verbal

¥ SEMANTIC


- Hyper-associative
- Explicit
- Meaning
- Procedural

Formation of Declarative Memory – PDP – On/Offline IP




Stickgold, R. 2002. *Journal of Clinical Psychology*, 58 (1): 61-75

Formation of Declarative Memory – PDP – On/Offline IP




Process of Declarative/Episodic Recall...Remembering



ENCODING vs. RETRIEVAL OF MEMORY

Semantic and Perceptual Memory Combined Data



Transfer-Appropriate Processing (TAP)

- ¥ **As memórias são representadas em termos das operações neurais que foram recrutadas quando o evento foi inicialmente codificado/processado.**
- **A recuperação bem-sucedida da memória ocorre quando essas operações anteriores são recapituladas...**


Cortical Reinstatement Model

¥ A memória/recordação de um evento ocorre quando um padrão de atividade/conexões corticais correspondente à codificação do evento é reinstalado pela ativação de uma recriação/reconexão desse padrão mediada pelo hipocampo.

DONALD HEBB, 1949

Aprendizagem hebbiana — “quaisquer duas células ou sistemas de células que estejam repetidamente ativos ao mesmo tempo tendem a se tornar ‘associados’, de modo que a atividade em um facilite a atividade no outro”...

•DONALD HEBB, 1949



"Células que disparam juntas, conectam-se juntas."



Shatz, C. J. (1992). The developing brain. *Scientific American*, 267(3), 60-67.

O PROBLEMA DA INTEGRAÇÃO e a SOLUÇÃO – OSCILAÇÃO DA BANDA GAMA DE 40 HZ




- ¥ Gerada por interneurônios talâmicos e corticais.
- Predominante em todo o sistema nervoso.
- Move-se em ondas rostrocaudais.
- Medeia o mapeamento global-temporal por meio de –
- varredura, direcionamento e sincronização
- de diversos conjuntos neuronais – oscilando em suas próprias frequências.
- Vinculando-os de forma coerente e temporal...

ROSTRA – CAUDAL 40 HZ OSCILLATION


Perceiving/Encoding


**Occipital gamma provides
a drive to association and memorial areas
facilitating linked synaptic encoding**




Recognizing/Remembering

**Gamma reflects a
'pattern completion' process
relinking needed synaptic encoding)**







Thalamo-Cortical-Temporal Binding/Mapping



Thalamo-Cortical-Temporal Binding/Mapping




Gamma Oscillation, Encoding & Retrieval



Oscilação gama, codificação e recuperação

FIGURE 1. Brain Activation Sites^a in Traumatized Subjects With and Without PTSD



^a Areas of significantly ($p < 0.001$) increased activation during the final 30 seconds of a 60-second period of recalling a traumatic event, relative to average baseline activation 60 seconds before each recollection of the traumatic event, superimposed on T₁-weighted magnetic resonance imaging templates.





Figure 1: Regions of activation during memory recall versus implicit baseline where the comparison group (n=10) shows greater activation than the PTSD group (n=10), $k > 10$.

Figure
1

Regions where patients with PTSD (without major dissociation) exhibited less activation during traumatic memory recall than trauma-exposed controls without PTSD¹¹



PTSD, posttraumatic stress disorder.

Memória implícita não declarativa

- ¥ A ideia de que a memória não é uma faculdade única tem uma longa história
- Bergson (1910) distinguiu entre um tipo de memória que representa nosso passado e uma memória que não é representacional, mas ainda permite que os efeitos do passado persistam no presente
 - Na memória não declarativa surgem nossos hábitos e preferências, inacessíveis à recordação consciente
 - Moldados por eventos passados, eles influenciam nosso comportamento atual e nossa vida mental e constituem parte fundamental de quem somos

Memória implícita não declarativa

¥ Inconsciente, expressa como imagens somatossensoriais automatizadas, crenças centrais e comportamento reflexivo e repetitivo

- A memória se reflete em diversas habilidades motoras e perceptivas, hábitos e aprendizagem emocional de natureza reflexiva.
- Em contraste com a memória declarativa, que é consciente e reflexiva.

Schacter, D.L. (1987). Implicit memory: history and current status. *Journal of experimental psychology*, 13, 501 – 518.

Memória implícita não declarativa

¥ Diferentemente da memória episódica, mediada por um sistema localizado

- O lobo temporal medial
- A aprendizagem/memória implícita não depende de um único sistema neural circunscrito
- Em vez disso, ocorre por mudanças nos sistemas de processamento distribuídos pelo cérebro
- Somatossensorial
- Subcortical


Schacter, D.L. (1987). Implicit memory: history and current status. *Journal of experimental psychology*, 113, 501 – 518.

LeDoux, Joseph (2002). *Synaptic Self*. New York: Penguin Books

Regiões que predizem memória explícita

Hipocampo

Hipocampo



Regiões que predizem memória implícita

Giro fusiforme

Cerebelo

Córtex pré-frontal ventromedial direito

Rede de Modo Padrão (DMN)

Regions Predicting Memória implícita

- Fusiform Gyrus
- Cerebellum
- Right Ventromedial Pref. Cortex
- The Rede de Modo Padrão (DMN)

Treder, M. S., et al. (2021). The hippocampus as the switchboard between perception and memory." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)*, 118(50), e2114171118.

Memória implícita não declarativa

¥ Um conjunto crescente de evidências empíricas sugere que a memória implícita já está operante no período intrauterino.

DMN e sistemas de memória

¥ A atividade da DMN é sustentada durante o funcionamento da memória implícita

- A atividade da DMN é fortemente suprimida durante o funcionamento da memória explícita
- Portanto, a ativação da DMN está associada ao processamento inconsciente em curso.
- Influências automáticas e reflexivas de nossas experiências passadas
- Somatossensoriais
- Subcorticais

Yang et al (2009). Sustained activity within the default mode network during an implicit memory task. *Cortex*, 46(3), 354-366.

Davis, L. (2012). The role of implicit memory in the development and recovery from trauma-related disorders. *NeuroScience*, 3, 63-88

Não reflexivamente conscientes

DMN e sistemas de memória

¥ Anos de dados sustentam a ideia de que

- A DMN participa mais de processos integrativos de memória orientados internamente/implicitamente
- É marcadamente suprimida durante o direcionamento de processos de memória explícita

Transtornos caracterológicos, do apego e TEPT complexo

¥ Do desenvolvimento

- Reflexivamente procedurais
- Não conscientes
- Não reflexivos

Transtornos caracterológicos, do apego e TEPT complexo

✧ Esses traços são codificados principalmente em

- Sistemas de memória implícita
- Sustentados principalmente por circuitos da
- Amígdala direita
- Estriado
- Cerebelo
- Tronco encefálico

Campos emocionais e relacionais

Nosso núcleo emocional biologicamente organizado é enviesado (ou condicionado) para determinadas respostas emocionais, mediadas pelos modelos neurais (emoções, cognições/crenças/memórias implícitas) de nossas experiências iniciais de apego.

Campos emocionais e relacionais

Essas memórias implícitas podem ser trabalhadas por meio do foco

- Em nossos “marcadores somáticos”.
- Sinais somáticos emocionais
- Que acessam reflexivamente nossas crenças/predições inconscientes


Campos emocionais e relacionais

¥ Experiências interpessoais da vida presente

- reativam os mapas neurais da infância.
- Isso ocorre inconscientemente
- e, muitas vezes, independentemente do que realmente está acontecendo,
- Assim, enviesando ou distorcendo nossa percepção emocional das interações pessoais.


Figure
1

Regions where patients with PTSD (without major dissociation) exhibited less activation during traumatic memory recall than trauma-exposed controls without PTSD¹¹



PTSD, posttraumatic stress disorder.

TEPT-C



¥ Lobo temporal medial
Córtex pré-frontal medial
Córtex cingulado posterior
Áreas hipocampais
Córtices parietais medial, lateral e inferior

Thomas et al. (2012). Treatment effects on insular and anterior cingulate cortex activation during classic and emotional Stroop interference in child abuse related complex PTSD. *Psychological Medicine*, 42, 2337-2349

Apresentações caracterológicas

¥ Modelos de apego

- Predições/expectativas interpessoais implícitas
- Hemisfério direito
- Domínios de crenças centrais
- Representações do self
- Representações de objeto
- Esquemas
- Cognitiones negativas

Predição neural

¥ Rodolfo Llinas (2001)

- A maior parte da consciência/processamento de informações
- É predição não consciente
- Muitos processos cerebrais são implícitos
- O cérebro direito simula continuamente resultados preditivos

Predição neural

¥ Rodolfo Llinas (2001)


- Isso gera
- Aprendizagem procedural
- Memória implícita
- Respostas emocionais automáticas

Predição neural

¥ Rodolfo Llinas (2001)


- **A consciência/processamento de informações**
“...evoluiu como o dispositivo orientado a objetivos que implementa interações previstas/intencionais entre um organismo vivo e seu ambiente. Para serem bem-sucedidas, tais transações exigem um instrumento herdado e pré-configurado que gere uma imagem subjetiva interna do mundo externo, a qual pode então ser

O cão de Pavlov — antes do EMDR



"AND THEN INSTEAD OF FEEDING ME
HE WOULD RING A LITTLE BELL."

O cão de Pavlov — depois do EMDR



PAPEL DA REDE DE MODO PADRÃO


¥ **Integra o modelo do self, o afeto e a memória implícita**

- **Está ativa durante estados gerados internamente**
- **Permanece altamente engajada durante o processamento implícito**
- **É suprimida durante tarefas explícitas que exigem esforço**
- **Medeia o self implícito**
- **Esquemas**
- **Representações do self**
- **Representações de objeto**
- **Cognições negativas**

Yang et al (2009). Sustained activity within the default mode network during an implicit memory task. *Cortex*, 46(3), 354-366.

Damis, L.F. (2022). The role of implicit memory in the development and recovery from trauma-related disorders. *NeuroScience*, 3, 63-88

PAPEL DA REDE DE MODO PADRÃO



Poerio, G.L. (2017). The role of the default mode network and component processes underlying the wandering mind. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 12(7), 1047 – 1062.

Louis Damis – 2022

¥ “A recuperação adequada de experiências traumáticas extensas exige mais do que a elaboração consciente de memórias autobiográficas traumáticas...

- É necessária a aplicação de estratégias de modificação da memória implícita e não consciente para facilitar uma recuperação mais adequada.”

Sintonia momento a momento

¥ Sintonia

- **Corregulação**
- **Comunicação não verbal**
- **Sincronia**

Sintonia momento a momento

¥ Muitos processos centrais de mudança

- Regulação afetiva
- Apego
- Conhecimento relacional implícito
- Dependem fortemente de
- Processamento lateralizado à direita
- Não verbal
- Corporificado

Sintonia momento a momento

- ¥ Como o processamento emocional lateralizado à direita está intimamente ligado à sinalização corporal e afetiva
 - o terapeuta frequentemente acompanha sensações, imagens mentais e tendências à ação
 - É uma forma de permanecer no nível em que a experiência realmente está organizada
 - É expressa em seu nível mais profundo

Sintonia momento a momento

¥ Aperto no peito

- Sensação de vazio no estômago
- Constrição na garganta
- Dormência
- Agitação
- Posturas de colapso
- Impulso de se esconder
- Impulso de se agarrar

Sintonia momento a momento e interocepção

A detecção e interpretação de sinais corporais internos

- Consciente
- Porta de entrada para a memória implícita
- Portanto, medeia a regulação emocional

APRESENTAÇÃO DE CASO

¥ Lyndi

- **Uso de crack por mais de um ano**
- **Estuprada quatro vezes**
- **Múltiplas internações em reabilitação**
- **Reuniões de Narcóticos Anônimos (NA)**
- **Incapaz de manter qualquer emprego**
- **Nada funcionou**

APRESENTAÇÃO DE CASO

¥ Sara

- 60 anos
- No ensino médio
- Sem que ela soubesse
- Recebeu biscoitos com alta concentração de THC
- Desde então
- Sofre de ataques de pânico graves

Em resumo

- ¥ **Trabalhar a memória implícita é superior, porque**
 - **A disfunção caracterológica é implícita por natureza**
 - **O insight explícito não reescreve previsões procedurais**
 - **Mudança duradoura exige reconsolidação da memória implícita**
 - **Não reinterpretação**
 - **O erro de Descartes**
 - **O self é sentido antes de ser pensado**

Resistência à pesquisa neural de Daniel Schacter

- O campo privilegiou a narrativa consciente porque a narrativa pode ser ensinada
 - Programas de formação em psicoterapia enfatizam fortemente:
 - Formulação de caso pelo cérebro esquerdo
 - Processo verbal
 - Construção de significado
 - Supervisão orientada para o insight

Resistência à pesquisa neural de Daniel Schacter

➤ Por quê?

- A narrativa é observável e discutível
- Ela se encaixa em manuais, transcrições de protocolos e provas
- Alinha-se à forma como os terapeutas são avaliados

Resistência à pesquisa neural de Daniel Schacter

- **A prática baseada em evidências restringiu o que “conta” como evidência**
- **À medida que a psicoterapia se alinhou aos ensaios clínicos randomizados, ocorreram várias distorções:**
- **ECRs favorecem intervenções manualizáveis e baseadas em linguagem**
- **Medidas de desfecho enfatizam relatos de sintomas (cognição explícita)**
- **A mudança implícita é não linear e dependente do contexto**
- **Difícil de pesquisar formalmente**

Resistência à pesquisa neural de Daniel Schacter

- O trabalho de Schacter prosperou em:
 - Neuropsicologia
 - Neurociência cognitiva experimental
 - Mas a pesquisa em psicoterapia passou a recompensar cada vez mais:
 - Redução de sintomas em curto prazo
 - Reestruturação cognitiva
 - Aquisição explícita de habilidades

Resistência à pesquisa neural de Daniel Schacter

- **A memória implícita ameaça a identidade do terapeuta**
 - **Essa parte raramente é reconhecida abertamente.**
 - **Se Schacter estiver certo, então:**
 - **O insight não é o principal mecanismo de mudança**
 - **O brilhantismo interpretativo do terapeuta é secundário**
 - **A mudança depende mais de como o paciente aprende do que do que o terapeuta explica**
 - **Isso é desestabilizador para a comunidade da psicoterapia**
 - **Isso desloca o papel do terapeuta de:**
 - **Intérprete de significado**
 - **para**
 - **Arquiteto das condições de aprendizagem**
 - **Muitas identidades terapêuticas — e escolas inteiras — não estavam preparadas para essa mudança.**